

**EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a**  
**Anul școlar 2025 - 2026**  
**Matematică**

**Varianta 5**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea**

- Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
- Nu se acordă punctaje intermediare.

**SUBIECTUL al III-lea**

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	a)	5p
2.	d)	5p
3.	c)	5p
4.	d)	5p
5.	b)	5p
6.	a)	5p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.	a)	5p
2.	d)	5p
3.	b)	5p
4.	c)	5p
5.	b)	5p
6.	b)	5p

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

1.	a) $\frac{x}{4}$ este suma cheltuită în prima zi și $\frac{1}{4}\left(x - \frac{x}{4}\right)$ este suma cheltuită în a doua zi, unde $x$ reprezintă întreaga sumă pe care a avut-o Maria inițial	1p
	Cum $\frac{1}{4}\left(x - \frac{x}{4}\right) < \frac{x}{4}$ , obținem că Maria nu a cheltuit în a doua zi mai mult decât în prima zi	1p
	b) $\frac{x}{4} + \frac{1}{4}\left(x - \frac{x}{4}\right) + 45 + \frac{x}{4} = x$ , unde $x$ reprezintă suma pe care a avut-o Maria inițial	1p
	$\frac{11x}{16} + 45 = x$ $x = 144$ de lei	1p
2.	a) $\frac{7}{x^2 - 4} + \frac{2}{x - 2} + \frac{3}{x + 2} = \frac{7 + 2(x + 2) + 3(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} =$	1p
	$= \frac{5x + 5}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{5(x + 1)}{(x - 2)(x + 2)}$ , pentru orice număr real $x$ , $x \neq -2$ și $x \neq 2$	1p

	<b>b)</b> $E(x) = \frac{1}{(x+2)(x+1)}$ , pentru orice număr real $x$ , $x \neq -2$ , $x \neq -1$ și $x \neq 2$	<b>1p</b>
	$E(n) = \frac{1}{6} \Rightarrow (n+1)(n+2) = 6$	<b>1p</b>
	Cum $n$ este număr natural, obținem $n = 1$	<b>1p</b>
<b>3.</b>	<b>a)</b> $f(-1) = \frac{3}{2}$ $f(1) = \frac{9}{2}$ , $f(-1) + f(1) = \frac{3}{2} + \frac{9}{2} = 6$	<b>1p</b> <b>1p</b>
	<b>b)</b> $A(-2,0)$ și $B(0,3)$ $AB = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ $\mathcal{A}_{\Delta ABC} = \frac{BC \cdot d(A, BC)}{2} = \frac{AB \cdot d(C, AB)}{2}$ , de unde obținem $d(C, AB) = \frac{6\sqrt{13}}{13}$	<b>1p</b> <b>1p</b> <b>1p</b>
<b>4.</b>	<b>a)</b> $AO$ este mediană în triunghiul dreptunghic $ABC$ , deci $AO = \frac{BC}{2}$ În triunghiul dreptunghic $DBC$ , $\sphericalangle DBC = 30^\circ$ , deci $CD = \frac{BC}{2}$ , de unde obținem $AO = CD$	<b>1p</b> <b>1p</b>
	<b>b)</b> $\sphericalangle ECD = \sphericalangle BCD - \sphericalangle BCE = 45^\circ$ Triunghiul $AOB$ este dreptunghic isoscel, cu $\sphericalangle AOB = 90^\circ$ $\Delta AOB \cong \Delta CDE$ , de unde obținem $AB = CE$	<b>1p</b> <b>1p</b> <b>1p</b>
<b>5.</b>	<b>a)</b> $AM \parallel DC \Rightarrow \Delta APM \sim \Delta CPD$ $\frac{AP}{CP} = \frac{AM}{CD} = \frac{1}{2} \Rightarrow CP = 2 \cdot AP$	<b>1p</b> <b>1p</b>
	<b>b)</b> În triunghiul $ABC$ , dreptunghic în $B$ , $AC = 3\sqrt{5}$ cm Triunghiurile $AMD$ și $BMC$ sunt dreptunghice isoscele, de unde obținem $\sphericalangle PMC = 90^\circ$ În triunghiul dreptunghic $PMC$ , $CP = 2\sqrt{5}$ cm, $MT$ este mediană, deci $MT = \frac{CP}{2} = \sqrt{5}$ cm	<b>1p</b> <b>1p</b> <b>1p</b>
<b>6.</b>	<b>a)</b> $AC \cap BD = \{O\}$ , $VO \perp (ABC)$ , $VO = 6\sqrt{2}$ cm $V = \frac{\mathcal{A}_{ABCD} \cdot VO}{3} = \frac{144 \cdot 6\sqrt{2}}{3} = 288\sqrt{2}$ cm <sup>3</sup>	<b>1p</b> <b>1p</b>
	<b>b)</b> $MN \perp (ABC)$ , $AD \subset (ABC)$ , deci $MN \perp AD$ , $NQ \perp AD$ , $Q \in AD$ și, cum $MN \cap NQ = \{N\} \Rightarrow AD \perp (QNM)$ $NT \perp MQ$ , $T \in MQ$ și $NT \perp AD$ , $MQ \cap AD = \{Q\}$ , de unde obținem $NT \perp (VAD)$ , deci $\sphericalangle(MN, (VAD)) = \sphericalangle(MN, MT) = \sphericalangle NMQ$ $MN = 3\sqrt{2}$ cm, $NQ = 3$ cm, de unde obținem $\operatorname{tg}(\sphericalangle NMQ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	<b>1p</b> <b>1p</b> <b>1p</b>